

Couleuvre à collier

Natrix natrix
Natricidae

Reptile

Espèce protégée en France, elle est classée en « préoccupation mineure » dans la Liste Rouge Nationale des vertébrés de France.

Comment la reconnaître ?



Crédits photographiques Philippe Geniez / EPHE-CEFE



- L'**aspect général** est gris, gris-vert ou parfois marron
- La taille va de 65 à 130 cm. Les mâles sont plus petits que les femelles.
- Elle possède une **série de barres verticales** noires sur les flancs du corps et **un collier** formé de deux taches noires se rejoignant sur la nuque et accompagnée d'un tâche blanc-jaune sur le cou.
- La **face ventrale** est ornée d'un motif en damier noir et blanc.



Regardez les écailles dorsales qu'elles soient carénées et non lisses.

Biologie de l'espèce

La période d'**activité** débute en mars et se termine en novembre. L'espèce est active le jour ; la nuit elle peut l'être aussi, notamment en période de reproduction des amphibiens (ses principales proies).




La période de **reproduction** s'étend d'avril à juin avec une ponte de 5 à 70 œufs dans des tas de végétaux en décomposition (compost, fumier, roseaux). Hors saison de reproduction, *Natrix natrix* passe son temps à prendre le soleil ou à chasser.

Elle est **inoffensive** pour l'homme.

Où la trouver ?

On le trouve généralement dans des **milieux humides** (prairies humides, mares, roselières, berges de rivière, étangs...) et, en moindre mesure, dans des clairières forestières, carrières, landes, collines sèches, lisières de jardin et même de culture. Largement distribuée en France mais moins abondante aujourd'hui dû à la diminution de ses proies, le recul de zones humides, la fragmentation des habitats et la disparition des sites de ponte.



Carte de distribution de l'espece. Realisation
Philippe Geniez et Marc Cheylan / EPHE-CEFE

Calendrier phénologique

[illegible]