

La Salamandre tachetée

Salamandra salamandra
Salamandridae

Amphibien

Espèce protégée en France, classée comme «à surveiller» dans la Liste Rouge Nationale des vertébrés de France.

Comment la reconnaître ?



Crédits photographiques Philippe Geniez / EPHE-CEFE

- Elle mesure de 11 à 21 cm.
- La **coloration** de la face supérieure du corps est **noire, tacheté de jaune vif**, parfois de rouge, d'orange ou de rose saumoné.
- Les membres sont épais ; les **doigts et les orteils sont dépourvus de palmures**.
- Présence de glandes parotoïdes* derrière la tête.
- La queue est arrondie à l'extrémité.



On peut la confondre avec la salamandre noire et la salamandre de Lanza, deux espèces dépourvues de tâches et montagnardes.

Période d'activité

L'adulte est plus visible de mars à avril mais son **activité** s'étend jusqu'en novembre. Ensuite il entre en période d'hivernage, qui a lieu dans le gîte occupé à la belle saison ou dans un milieu souterrain où se regroupent parfois plusieurs individus à l'issue d'une migration automnale (grotte, galerie de mines ...).




Espèce **vivipare**, la portée se compose de 8 à 55 larves. Le jeune -ou juvénile- est difficile à voir. La salamandre est nocturne et peut être surprise en retournant des pierres et des troncs mais attention de remettre en place ces «cachettes» après observation.

Calendrier phénologique

[illegible]

Où la trouver ?

La salamandre se trouve principalement dans le bocage et les boisements de feuillus mixtes ou de plaine et d'altitude, mais aussi dans les forêts de pentes fraîches (hêtraie ou érablière), les boisements humides (types aulnaies et frênaies) et les abords de sources. On peut la rencontrer en montagne dans d'anciennes carrières d'ardoises.



Carte de distribution de l'espèce. Réalisation
Philippe Geniez et Marc Cheylan / EPHE-CEFE